

Exemplares fotografados por J. Moure
II.1970

- 2 - Gigantotrichoderes conicicollis Tippmann, 1953 x 2/3
Exemplar ♂ do Amer. Mus. Nat. Hist., figura-
do em Lane, F., 1970, Atas Soc. Biol. Rio de
Janeiro, 14 : 9-10, fig. F. Lane det.57.
- 1 - Idem, também ♂, l. c., exemplar do Ecuador, Playas x 1
de Montalvo, Prov. de Los Rios, até 15 m. de
altitude. Comp. 29 mm; larg. umer., 9,5 mm.
Amer. Mus. Nat. Hist. F. Lane det. 57.
- 3 - Sthelenus ichneumoneus Buquet, 1859, ♂. F. Lane x 1
det. 1971. Coleção Ricardo von Diringshofen.
Exemplar de S. Paulo de Olivença.
- 4 - Tacocha aequatoria F. Lane, 1970. Holótipo ♀ x 1,5
no Museu de Zoologia da Universidade de
São Paulo. Studia Ent., 13 : 399-401.
- 5 - Hilaroleopsis vogti F. Lane, 1970. Holótipo ♂ x 2
no U. S. Nat. Mus. Studia Ent., 13 : 406-
408.
- 6 - Ocoa ochromimoides F. Lane, 1870. Holótipo ♀ x 2
na coleção do Amer. Mus. Nat. Hist. Studia
Ent., ~~13~~ 13 : 401-403.
- 7 - Alphus gounellei, sp. n. Holótipo ♂ na coleção x 2
Campos Seabra (ined.)
- 8 - Alphus aurivillii F. Lane, 1970. Parátipo ♀ no x 2
Mus. Nat. Hist. Nat. de Paris.
- 9 - Dufauxia kourouana F. Lane, 1970. Holótipo ♀ x 2
no Mus. Nat. Hist. Nat. de Paris
- 10 - Oreodera grossa Tippmann, 1960. Parátipo ♀ (aló- x 1
tipo) na coleção Campos Seabra. Vide Tippmann,
1960, Koleopt. Rundschau, 37/38 (1959/60) :
157-158. Syn. de Oreodera charisoma F. Lane,
1955. Vide Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro,
1970, 14 (1-2) : 31.
- 11 - Acanthosphenopsilus flavocinctus Tippmann, 1960. x 2
Parátipo ♂ na coleção Campos Seabra. Syn. de
Probatus choliniformis F. Lane, 1956. Vide
Atas Soc. Biol. R. J., 14 : 32. Nota inédita :
Tippmann cita apenas o holótipo em sua coleção,
mas figura o parátipo autenticado por ele e
pertencente à coleção ~~de~~ CACS.

- 12 - Stethosperma zikani Melzer, 1923. C6tipo = X 2
par6tipo (♀). IEEA
- 13 - Stethosperma batesi Laneere, 1885. Melzer det. x 2
IEEA. Exemplar de : Brazil / Espirito Santo/
Faz. Jerusalem / 4-12-1911 / J. F. Zik6n. IEEA
- 14 - Alphus bruchi Melzer, 1931. "C6tipo" ♂ IEEA x 3
- 15 - Aerenea apicalis Melzer, 1923. "C6tipo" Exemplar x 3
do Bosque da Saude. IEEA
- 16 - Aerenea sulcicollis Melzer, 1932. "C6tipo" x 3
IEEA Exemplar de S. Paulo (Epitacio Pessoa)
- 17 - Estoloderces navarroii Melzer, 1928. "C6tipo" de x 3
Minas (Passa Quatro). IEEA
- 18 - Aerenea subnuda Melzer, 1923. "C6tipo" de Campinas, x 2
Merbach leg. IEEA
- 19 - Stoloderces luederwaldti Melzer, 1928. "C6tipo" x2
de Minas (Passa Quatro), Jaeger leg. IEEA
- 20 - Aereneini sp. Est. de Minas / X-1925 / Coll. x 2
Loreto M. de Abreu. Inst. Biolog. Entomologia
Agricola Rio de Janeiro. IEEA
- 21 - Schreiteria bruchi Melzer, 1933. "C6tipo" ♂ figurado x 1,5
no trabalho de Melzer. Anotar que a figura de
Melzer est6 invertida; a antena incompleta 6 a do
lado direito. IEEA
- 22 - Onocephala obliquata Lacord., var. decorata Melz. x 1,5
Tipo (sem descri76o). IEEA
- 23 - Mallocera pickeli Melzer, 1931. "C6tipo" ♀. IEEA x 1,5
Aqui deve haver alguma confus6o, pois o rotulo
de localidade do exemplar indica : Brazil - S.
Paulo / Est. S. Paulo e a data 1915. Os exem-
plares da s6rie t6pica s6o todos de Pernambuco.
Vide Melzer, 1931, Arch. Inst. Biol., 4 : 52-53,
est. 10, fig. 3. O exemplar aqui discutido
coincide muito bem com a figura 3 de Melzer, que
parece estar invertida : o lado direito do exem-
plar combina com o esquerdo da figura e vice-versa.
- 24 - Ptericoptus adustus Burm., 1865. Melzer det. x 2
Exemplar de Alta Gracia La Granja / Sierras
de C6rdoba / C. Bruch leg. IEEA

- 25 - Rhathymoscelis zikani Melzer, 1931. Tipo ♀ x 1
IEEA Aqui também a figura de Melzer
esta invertida.
- 26 - Rhathymoscelis sp. n. (ined.) Exemplar de Kartabo x 1
Mus. Comp. Zool.
- 27 - Rhathymoscelis melzeri Costa Lima, 1922, ♀ x 1
F. Lane det. 1940. Mus. Zool. Univ. SP.
Exemplar de : Riachuelo / Rio de Janeiro /
X - 1939 / E. Nascimento.
- 28 - Rhathymoscelis melzeri Costa Lima, 1922, ♂ x 1
Museu Nacional no. 49 / 423 Proc. Rio.
F. Lane det. 1964
- 29 - Antodice inscripta F. Lane, 1970. Parátipo ♀ x 1,5
Mus. Zool. Univ. S.P.

Film 2 :

- n. 1,5: Antodice neivai F. Lane, 1940. Holótipo ♀ x 1,5
IEEA
- 2 - Antodice abstrusa F. Lane, 1940. Holótipo ♂ IEEA x 2
- 3 - Antodice aeneiventris Tippmann, 1960. Parátipo ♂ x 2
Este parátipo rotulado por Tippmann não se
encontra citado na diagnose original. Ex=ssis=
gã
- 4 - Antodice ornatulla, sp. n. (ined.) Holótipo ♀ x 2
Carnegie Museum.
- 5 - Antodice mendesi F. Lane, 1940. Holótipo ♂ IEEA x 2
- 6 - Antodice mendesi F. Lane, 1940. Alótipo x 2
Mus. Zool. Univ. S. Paulo
- 7 - Antodice picta (Klug, 1825), ♂ Amer. Mus. Nat. x 2
Hist. F. Lane det. 1957.
- 8 - Antodice sexnotata Franz, 1959, ♂ CACS x 2
F. Lane det. 1962* Exemplar de El Salvador.
- 9 - Antodice sp. (elegans, sp. n.). ♀ Ex. de Linhares x 2
Coleção Campos Seabra
- 10 - Antodice bivirgata, sp. n., Panamá USNM x 2
- 11 - Antodice pudica F. Lane, 1970, ♂. Holótipo x 2
Mus. Nat. Hist. Nat. de Paris Vide Studia
Ent., 13 : 427-428.

- 12 - Eulachnesia cobaltina Bates, 1881, ♀ Comp. with type 61 x 2
AMNH Exemplar de Colombia.
- 13 - Eulachnesia cobaltina Bates, 1881, ♀ Comp. with type 61. x 1,5
MNHN-Paris Exemplar de Bogotá.
- 14 - Eulachnesia smaragdina Bates, 1872, ♀ CWT-61 x 1,5
USNM (ex-col. Tippmann). Ex. de Chiriqui.
- 15 - Eulachnesia smaragdina Bates, 1872, ♀ CWT-61 x 1,5
USNM Exemplar de Turrialba, Costa Rica.
- Não anotei as localidades para diferenciar os exs.
14 e 15 no meu rascunho. Para evitar equívoco, o
exemplar da coleção Tippmann (14) é o que apresenta
o amarelo mais extenso na base e ápice dos élitros. ✓
- 16 - Eulachnesia aequatoria Bates, 1881, ♀. CWT-61 x 1,5
MNHN-Paris Ex. de Macas, Equador.
- 17 - Eulachnesia sp., ♂. Ecuador / Guayaquil/ Cuenca / x 1,5
4.III.1965. Mus. Zool. Univ. SP
- 18 - Eulachnesia sp., ♀, vista lateral. Mus. Zool. Univ. x 1,5
SP. Mesmas indicações do exemplar anterior.
- 19 - Eulachnesia calliste Bates, 1881, ♀. Calif. Acad. x 2
Sciences. Exemplar de Perú / Monson Valley /
Tingo Maria / X-10-1954 // E. I. Schlinger/& E. S.
Rose / collectors. = Amphionycha holmgreni
Auriv., 1909 (Syn. inedit.) CWT
- 20 - Eumimesis heilipoides Bates, 1866, ♀. CACS x 2
Ex. do rio Itecobi. F. Lane det. 1958.
- 21 - Chalcolyne metallica (Pascoe, 1858), ♀. CACS x 2
Exemplar de Tefé CWT-1961.
- 22 - Eumimesis d'almeidai Dillon & Dillon, 1946, ♀ x 2
Exemplar de Barro Colorado, Canal Zone. CWT
- 23 - Gryllica flavopustulata Thoms., 1860, ♀ CWT x 2
Ex. da Represa Rio Grande GB MZUSP
- 24 - Gryllica pygmaea, sp n., ♀. (inedit) MNHNParis x 3
Exemplar do Paraná
- 25 - Eumimesis d'almeidai Dillon & Dillon, 1946, ♀ CWT x 2
Exemplar de Barro Colorado, Canal Zone VII-1941

- 26 - Ischioloncha wollastoni Thomson, 1860. Paralectótipo ♂ x 2
MNHNParis
- 1/4 28 - Cauca contestata F. Lane, 1970. Holótipo ♀ x 2
USNM (ex-col. Tippmann)
- 28 - Sympergoides nasutus F. Lane, 1970. Holótipo ♂ x 2
MNHNParis
- 29 - Symperga balyi Thomson, 1860, ♀ MNHNParis x 2
 Exemplar da Guiana Francesa, Coleção Oberthur.
- 30 - Merocentrum lanei Prosen, 1957. Holótipo ♀ x 2
Coleção Prosen
- 31 - Xylomimus baculus Bates, 1865, ♂ CWT MNHNParis x 2
- 32 - Symperga puncticollis Breuning, 1940, ♀ MZUSP x 2
 F. Lane det. 1957. Amazonas / Rio Juruá /
 1902 E. Garbe coll.
- 33 - Eudesmus caudalis Bates, 1865, ♂ Coleção Prosen x 2
 CWT Ex. de Bolivia, Cochabamba.
- 34 - Symperga ~~puncticollis~~ Breuning, 1940, ♀ balyi Thoms., x 2
 1860. Obidos Coleção Campos Seabra
- 35 - Ischioloncha wollastoni Thoms., 1860, ♂ CACS x 2
 Exemplar de Obidos.
- 36 - Ischioloncha sp. ♀ Pernambuco USNM (Tippm.) x 2 3
- 37 - Hesychotypa sp. Fragoso det. 70. Coleção Dirins- x 1,5
hofen Acre, Tarauacá.
- 38 - Clavidesmus metallicus (Thoms., 1868), ♀ Bosq det. x 1,5
Coleção Campos Seabra
- 39 - Eudesmus heterocerus Buquet, 1852, ♂ Coleção Campos x 1,5
Seabra (ex-Guérin ?)
-

Film 3

- 2/3 - Prosenella muhni (Bruch, 1933), ♂. Col. Prosen x 3
Exemplar montado em cartão, de Mojotoro, Salta,
República Argentina.
- 2 - Gounellea franzae F. Lane, 1970, ♂ e ♀ Holótipo x 1,25
e alótipo. Coleção Campos Seabra.
- 3 - Xenonta erythronota F. Lane, 1970. Holótipo ♀ x 2
Coleção Campos Seabra
- 4 - Mariliana niveopicta F. Lane, 1970. Holótipo ♀ x 2
Coleção Campos Seabra
- 5 - Mariliana rupicola F. Lane, 1970. Holótipo ♂ x 2
Coleção Campos Seabra
- 6 - Chrysaperda metallica Bates, 1881, ♀ MNHNParis x 2
Exemplar de Ecuador.
- 7 - Chrysaperda circumcincta Pascoe, 1859, ♀ USNM (Tip- x 2
pmann Collection).
- 8 - Aphilestes rustica Bates, 1881, ♀ USNM ~~(Tippmann~~ x 1,5
(Tippmann collection). Bolivia
- 9 - Megacera vittata Serv., 1835. Museu Nacional x 1
- 10 - Megacera rigidula Bates, 1866, ♀ Tippmann det. x 2
Coleção Campos Seabra Exemplar do Jabaquara
- 11 - Megacera praelata Bates, 1866, ♂ F. Lane det. x 1,5
AMNH Exemplar de Tefé.
- 12 - Ochromina 10-maculata Melzer, 1931, "Cótipo" ♀ IEEA x 2
Exemplar de Manaus. Syn. de Amphionycha mar-
ginicollis Gahan, 1889. Vide Studia Ent., 13 :
403-406.
- 13 - Ochromina megalopoides Bates, 1866, ♀ F. Lane det. x 2
AMNH Exemplar da Guiana Inglesa.
- 14 - Adesmus sericipennis (Bates, 1885) (Amphionycha) x 2
Paralectótipo ♀ MZUSP

- 15 - Brachychilus consobrinus F. Lane, 1939. Tipo ♂ x 2
MZUSP n. 22.931
- 16 - ~~Amphienyche cordipicta~~ F. Lane, 1959. Holótipo ♂ x 2,5
Adesmiella (Coleção Campos Seabra
omimus)
- 17 - Ptericoptis truncatus Melzer, 1935. "Cótipo" IEEA x 2,5
Exemplar do Bosque da Saude. Vide Melzer, 1935,
Arch. Inst. Biol. Veget., 2 (2) : 189-190.
- 18 - Dorcasta implicata Melzer, 1934. "Cótipo" IEEA x 2,5
- 19 - Estoloderces proletaria Melzer, 1931. "Cótipo" x 2,5
IEEA Estoloderces Melz. = Lypsimena LeC.
Vide Cat. Lam. du Monde p. 520. O "cótipo"
acima é o de Tapera, Pernambuco.
- 20 - Stizocera horni Melzer, 1923. "Cótipo" IEEA x 2,5
- 21 - Lepturges eurynota Tippmann, 1960. Parátipo ♀ x 2,5
Coleção Campos Seabra. Este parátipo per-
tence à ex-coleção Zellibor (exemplar de Pu-
callpa, 2.4.952) e não ao acervo de Tippmann.
Vide Tippmann, 1960, Kol. Rundschau, 37/38 :
191.
- 22 - Acanthoderes curvistriata Tippmann, 1960. Parátipo ♀ x 3
Exemplar de Sta. Marianna, Paraná, na coleção
Campos Seabra e não do acervo Tippmann.
- 23 - Idem : Tipo ♂ - Coleção Campos Seabra e não do x 3
acervo Tippmann.
- 24 - Anisopeplus perplexus Melzer, 1935. "Cótipo" IEEA x 2
Exemplar do Paraná, Rio Negro. Segundo
Breuning, 1963, Cat. Lam. du Monde, fasc. 7,
p. 511, Anisopeplus Melz. é sinonimo de
Coeloprocta Auriv., 1926, afinidade já pre-
vista no trabalho de Melzer.
- 25 - Erythroplatys sp., inedit. Chapada Carn. Mus. x 2
- 26 - Plistonax inopinatus F. Lane, 1960. Parátipo ♀ x 1,5
MZUSP (ex-coleção Campos Seabra).
- 27 - Adesmus seabrai F. Lane, 1959, ♀ CWT CACS x 1,5
Exemplar de Espirito Santo, Corrego do Itá,
XI.1957, A. Almeida.

- 28 - Pannychis sericeus Thoms., 1864, ♀. CWT MZUSP x 2
- 29 - Pannychis ducalis Bates, 1881, ♂. CWT BM x 2
- 30 - Temnopsis signatipennis^{cornis} Melzer, 1920. "Cótipo" ♂ x 2
IEEA
- 31 - Eurymerus decoratus Melzer, 1935, ♂. "Cótipo" x 2
IEEA, Exemplar de S. Paulo (Capital).
- 32 - Atenizus taunayi Melzer, 1920. "Cótipo" ♀ IEEA x 2
Exemplar do Bosque da Saude.
- 33 - Cometes zikani Melzer, 1926. "Cótipo" ♂ IEEA x 2
Exemplar de Minas Geraes, Virginia, Faz. dos Campos, 21.XI.1919, J. F. Zikán.
- 34 - Argentinoeme schulzi Bruch, 1911. Tipo ♂ IEEA x 2
- 35 - Stenoeme recki Melzer, 1931. Tipo IEEA x 2
- 36 - Ectenessa quadrispinosa Melzer, 1931. "Cótipo" x 2
IEEA Exemplar do Espirito Santo, Guandú, 16.XI.1920, F. Hoffmann leg.

O resto segue breve.